

Lapins



- Origen: Obtenida por cruzamiento de Van x Stella (Summerland, Canadá).
- Características generales: Árbol vigoroso, de hábito erecto, de difícil ramificación.
- Polinización: Autofértil
- Requerimiento de frío invernal: Bajo (400 a 500 hrs bajo 7 °C).
- Sensible a cáncer bacterial (*Pseudomonas*).
- Tamaño de fruto: Calibre mediano a grande; 26 a 30 mm. Esta característica depende del portainjerto, carga y vigor de los árboles.
- No destaca por su calidad organoléptica, pero se considera de buen sabor.
- Sólidos solubles: 18 a 22 °Brix.
- Buena firmeza.
- Calibre y firmeza muy dependiente de la carga.
- Con portainjertos debilitantes produce en exceso, con la consecuencia de que el calibre y firmeza de la fruta caen significativamente.
- Muy buena precocidad y productividad.
- Productividad potencial: 15-20 ton/ha.
- Época de cosecha: Media estación a tardía (segunda a tercera semana de diciembre en la Región del Maule).
- Índices de madurez de cosecha:
 - Color: Inicio: Rojo
Óptimo: Rojo caoba
Riesgo de sobremadurez: Caoba oscuro
 - Firmeza Durofel ≥ 75
 - Sólidos solubles ≥ 18 °Brix
- Moderadamente sensible a la partidura.
- Sensible a “pitting”.
- Potencial de postcosecha: Mediano a largo periodo, de acuerdo a firmeza en cosecha. Apta para flete marítimo a mercados de media a larga distancia.
- Zonificación: Por su bajo requerimiento de frío y fecha de cosecha, se puede plantar en una amplia zona, para cosecha desde fines de noviembre a fines de diciembre; regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule y del Biobío.
- Libre de Royalty.