

Momentos clave para la realización de aplicaciones preventivas de fungicidas en estados fenológicos tempranos en cerezos



Comité de Cerezas

CINCO MOMENTOS CLAVE PARA EL CONTROL DE PREVENTIVO DE ENFERMEDADES

1



RAMILLETE EXPUESTO

Estado 3

2



BOTÓN BLANCO

Estados 4-5

3



PLENA FLOR

Estado 6

4



CAÍDA DE PÉTALOS

Estado 7

5



CAÍDA DE CHAQUETA

Estado 8

FOCO DE CONTROL

Botrytis · Alternaria · Geotrichum · Cladosporium

REGLAS CLAVES PARA DEFINIR ESTRATEGIA

I. Alternar entre estados

Alternar ingrediente activo y modo de acción entre estados fenológicos.

II. Regular pH de solución

Con la utilización de i.a. Captan el pH de la solución debe ser menor o igual a 5,5.

III. Programa preventivo

Aplicar antes de eventos de precipitaciones. Preferir i.a. sistémicos con mojamiento y cubrimiento adecuado.

✓ Preventivo

Cuando los programas se ejecutan de manera preventiva, el huerto recibe el evento de precipitaciones cubierto y se disminuye la probabilidad de establecimiento del patógeno.

× Reactivo

Cuando los programas no se ejecutan de manera preventiva, se recibe el evento de precipitaciones descubierto y aumenta la probabilidad de establecimiento del patógeno.